



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO “DANIEL ALCIDES CARRIÓN” Huancayo 2011

*Balbin Pimentel, Leoncio, Orihuela De Santana, Luz, Rodríguez Rojas, María E.
Instituto de Investigación de la Facultad de Medicina Humana*

RESUMEN

En el Perú la cirugía general y especializada ha alcanzado grandes lauros sobre todo por la cirugía del trasplante, cuya preocupación del médico es ser cada vez más experto en la cirugía que desempeña, tanto científica como técnicamente a nivel de enfermería la especialidad en cirugía y anestesia los hace expertos cuya preocupación es por la eficiencia y eficacia de los resultados de la cirugía en los aspectos biológicos dejando en mínima atención el aspecto psicológico y espiritual de la persona enferma a diario se puede percibir las diferentes manifestaciones del paciente que recibe la noticia de tener que someterse a la cirugía como medida para recuperar su salud creando en su persona y familiar un conjunto de conjeturas que requieren ser aclaradas, explicadas por parte del médico y personal de enfermería.

Estas personas candidatas a cirugía, se muestran tensión, negativitas poco colaboradores por el temor al tipo de cirugía, al efecto de la anestesia, a sus posibles complicaciones, temor a la muerte, se suma a esto el alejamiento de sus familiares. Las personas candidatos a cirugía expresan su malestar, frente a la atención recibida desde su ingreso, antes y después de la operación de parte del médico y la enfermera.

Por lo que los investigadores consideramos importante realizar el trabajo de investigación “**NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO “DANIEL ALCIDES CARRIÓN” Huancayo 2011**, cuyo objetivo general fue el de determinar el nivel de percepción de las personas candidatos a cirugía en su etapa pre y post operatoria y complicaciones.

El tipo de investigación es descriptivo y explicativo. La técnica la entrevista dirigida y los instrumentos se aplicó a 130 personas candidatos a cirugía en los servicios de cirugía general y especializada tanto de hombres y mujeres.

Se empleó la estadística de tendencia de medida central.

Palabras clave: cirugía, cuidado quirúrgico, proceso quirúrgico..



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

DESARROLLO PONDOESTATURAL EN MENORES DE SEIS MESES CON LACTANCIA MATERNA EN EL HOSPITAL ESSALUD- HUANCAYO 2011

Torres Montalvo, Víctor Augusto
Instituto de Investigación de la Facultad de Medicina Humana

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue determinar el desarrollo ponderoestatural de niños menores de seis meses con lactancia materna exclusiva en el hospital IV ESSALUD de Huancayo en el 2011.

El estudio fue descriptivo, prospectivo y transversal, la población de estudio estuvo constituido por 262 niños nacidos en el Hospital ESSALUD de Huancayo, los cuales cumplieron al menos con 3 cantidades prenatales, peso de 2500g a más y ausencia de infecciones.

La técnica de recolección fue en base a ficha con datos del niño y de la madre.

Se acreditan 137 niñas (53 %) y 125 niños (47 %).

El promedio de peso que fue de 3204 ± 480 para niños y 3095 para niñas.

Cincuenta y seis por ciento eran primeros hijos y 22.6 segundos.

La edad materna en 35 % estaba entre 26 y 30 años en 29 % entre 20.25 y solo 2 eran menores de 20 años.

Se comprobó según las tablas de evolución ponderoestatural un crecimiento acelerado durante los tres primeros meses y un ritmo algo menor en los meses siguientes.

Se concluye que los hallazgos son mayores de ganancia ponderoestatural que en el hospital MINSA de Huancayo y Huánuco.

Se requiere profundizar estudios pues son mínimos en la región.

Palabras clave: ganancia ponderoestatural, lactancia materna, controles prenatales.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS DE 1 MES A 13 AÑOS HOSPITALIZADOS EN ESSALUD-HUANCAYO ENTRE JUNIO 2010-MAYO 2011¹

*Aristóteles S. Huamani Janampa, Carmen E. Fuente Magán, Carlos A. Torres Paulino.
Instituto de Investigación de la Facultad de Medicina Humana*

Resumen

La anemia es un problema de salud pública tanto para los países en desarrollo, en donde se estima una prevalencia superior a 35%, como para los países industrializados, siendo las mujeres embarazadas y los menores de dos años los más afectados. En los niños con deficiencia de hierro y anemia se ha detectado un deterioro en la capacidad de atención y de aprendizaje, el mismo que es irreversible a pesar del tratamiento que se administre si este no es oportuno. El objetivo de este trabajo fue contribuir al conocimiento sobre la variación de la Hb y el Hto en los pacientes hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé (H.N.R.P.P.)-Es salud-Huancayo, evaluar la prevalencia de anemia y relacionar estas variaciones con las variables de edad, sexo, estado nutricional de la población analizada. Materiales y Métodos: El presente trabajo es un estudio observacional, prospectivo, descriptivo y analítico. La población está conformada por los niños entre 1 mes de vida y 13 años de edad hospitalizados en el Servicio de Pediatría entre los meses de Junio del 2010 y Mayo del 2011 en el H.N.R.P.P.-Essalud, Huancayo-Perú. Como criterios de deficiencia se consideraron: Hb por debajo del valor para la edad y sexo. Para este estudio se ha adoptado la fórmula de CDC/PNSS y Dirren y las mediciones iniciales del nivel de hemoglobina han sido llevadas a nivel del mar. Se consideraron 4 grupos de edad: a) 1m a < 2 años; b) 2 a <6 años c) 6 a < 12años d) 12 y 13 años. Para su análisis se agruparon por edad, sexo, valor del VCM y estado nutricional. Resultados: La anemia es alta en nuestra población de estudio (85.63%) y estos casos son más frecuentes en el grupo etáreo de menor edad (41.82%), disminuyendo a medida que la edad aumenta. Las mujeres son las más afectadas (44.81% vs 40.81%). Las mujeres en general son discretamente las más afectadas por la enfermedad pues en el 87.37% de ellas se han diagnosticado anemia en comparación al 85.93% de varones que sufren de anemia. Según el promedio general por grupos, los valores más bajos se encuentran en menores de 6 años, sin embargo en todos los grupos se observa deficiencia de hemoglobina. El tipo de anemia leve fue la más predominante (69%), seguido de la moderada (22.43%) y severa (8.46%). El nivel de hemoglobina se asoció positivamente con el estado nutricional de los niños. En los menores de 2 años, la mayoría de los casos de anemia muestran un VCM por debajo de los límites normales (80-100fl), los que nos demuestra que este grupo es el más vulnerable a la deficiencia nutricional debido a una falta de cantidades específicas de hierro en la alimentación diaria. Conclusiones: Se presenta evidencia de una alarmante epidemia nacional de anemia en niños, especialmente preocupante en los menores de 24 meses de edad. La deficiencia de hierro es una de las deficiencias de micronutrientes más comunes, un reconocimiento oportuno puede prevenir una anemia ferropénica, etapa final y grave de dicha deficiencia, insuficientemente conocida en nuestro país.

Palabras clave: anemia, hemoglobina, VCM, estado nutricional, Huancayo.

¹ Email: investigacion@uncp.edu.pe